



MINISTERO DELLA SALUTE

*Istituto Superiore di Sanità*  
*Centro Nazionale Trapianti*

*Roma*, 16 marzo 2020

Prot. 592/CNT 2020



WHO Collaborating Centre  
On Vigilance and Surveillance for  
Human Cells, Tissues and Organs

Assessorati alla Sanità

Centri Regionali di Riferimento per i Trapianti

Centro Regionale Nitp

IBMDR

GITMO

Dott. Claudio D'Amario  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
Direttore Generale  
Ministero della Salute

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini  
Direttore Ufficio VII  
Trapianti, sangue ed emocomponenti  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
Ministero della Salute

Dott. Francesco Paolo Maraglino  
Direttore Ufficio V - Prevenzione delle malattie  
trasmissibili e profilassi internazionale  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
Ministero della Salute

Dott.ssa Cristina Tamburini  
Direttore Ufficio IX - Tutela della salute della donna,  
dei soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze  
Direzione generale della prevenzione  
Ministero della Salute

e, p.c. Prof. Silvio Brusaferrò  
Presidente  
Istituto Superiore di Sanità

Dott. Giancarlo Maria Liumbruno  
Direttore Centro Nazionale Sangue  
Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma  
Tel +39 06/4990.4040 - 4041 - 4045  
Fax. +39 06/4990.4101  
e-mail: cnt@iss.it - PEC: cnt@pec.iss.it

[www.trapianti.salute.gov.it](http://www.trapianti.salute.gov.it)

Dott. Giovanni Rezza

Dott. Patrizio Pezzotti

Dott.ssa Flavia Riccardo

Dipartimento Malattie Infettive – DMI  
Istituto Superiore di Sanità

**Oggetto:** indicazioni sull'effettuazione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 nei riceventi di trapianto d'organo da donatore vivente e donatore deceduto

In considerazione delle disposizioni previste dai vari DPCM e circolari ministeriali, e in relazione alla fragilità clinica dei pazienti in lista d'attesa, nonché allo stato di immunosoppressione a cui il paziente andrà incontro dopo il trapianto, si raccomanda quanto segue:


- 1) il tampone rinofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 sulle secrezioni respiratorie dovrà essere effettuato prima del trapianto su tutti i riceventi in attesa di trapianto di organo da donatore deceduto e da donatore vivente, **sintomatici o paucisintomatici** per COVID-19 o che abbiamo avuto contatti con soggetti positivi per SARS-CoV-2;
- 2) nei riceventi in attesa di trapianto di organo da donatore deceduto, asintomatici o per i quali si possa, con ragionevole sicurezza, escludere contatti con soggetti affetti da COVID-19, la decisione sull'esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 sulle secrezioni respiratorie è lasciata al curante, in relazione al rispetto di specifiche disposizioni aziendali e regionali, ed alle tempistiche di risposta del test, che potrebbero non essere compatibili con l'effettuazione del trapianto;
- 3) il tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 sulle secrezioni respiratorie, in via precauzionale, è suggerito nei riceventi asintomatici in attesa di trapianto di organo da donatore vivente, entro le 72 ore dalla data prevista del trapianto. In questo caso, la possibilità di programmare l'effettuazione del test e quindi le tempistiche di risposta, non interferiscono con quelle del trapianto.

**Va sottolineato che la sensibilità del tampone rinofaringeo per SARS-CoV-2 nei soggetti asintomatici è estremamente bassa e la negatività non è in grado di escludere un'infezione in incubazione.**

Cordialmente

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti

Dott. Massimo Cardillo



Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma  
Tel +39 06/4990.4040 - 4041 - 4045  
Fax. +39 06/4990.4101  
e-mail: cnt@iss.it - PEC: cnt@pec.iss.it

[www.trapianti.salute.gov.it](http://www.trapianti.salute.gov.it)